

aids

É uma doença causada pelo vírus HIV que ataca e destrói o sistema imunológico. Em muitas pessoas pode demorar anos para aparecer, e este é o grande perigo, pois uma pessoa aparentemente saudável pode ter o vírus sem saber e transmiti-lo nas mais diversas formas - pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno. Portanto, a informação e a prevenção são cada vez mais importantes.

Converse com seu parceiro, com seus filhos e amigos. O diálogo pode evitar que a doença se espalhe

USE CAMISINHA SEMPRE!



APOIO E ATENDIMENTO EM CAMPO GRANDE

Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA

Serviço de referência para coleta e diagnóstico sorológico de HIV. Aconselhamento pré e pós-teste. O atendimento é sigiloso e o anonimato garantido somente você saberá o resultado.

Centro Especializado Municipal - CEM

Travessa Guia Lopes, 71 - Fone: 314-3133 - Disk Aids

Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis - ADST

Centro Especializado Municipal - CEM - 314-3134

Centro de Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias - CEDIP

Av. Coronel Antonino em frente ao terminal Nova Bahia - B. N. Bahia. Fone: 314-8290.

SAE - Serviço de Assistência Especializada

Ambulatório com equipe de Médico Infectologista, Enfermeiro, Assistente Social, Psicólogo e Farmacêutica. Acompanhamento dos soros positivos



MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / PN / DST / AIDS

pessoas vivendo com aids.

H.D - HOSPITAL DIA

O doente pode permanecer por 06 ou 12hs com direito a acompanhamento médico, social, psicológico e de enfermagem, recebendo medicação e realizando exames necessários para evitar a internação hospitalar convencional.

Assistência Domiciliar Terapêutica - ADT

Serviço composto por médico infectologista, enfermeiro, assistente social, psicólogo e auxiliar de enfermagem: atende pacientes de aids em seu domicílio. É referência para os detentos, atendendo em casos de aids/DST e outras infecções.

Hospitais Credenciados para Internação:

H.U - Hospital Universitário

Av. Filinto Mulher, s/n - Fone: 345-3000

Hospital São Julião


Rua Lírio Vilacha, 1250 - Bairro São Julião - 79.017-200 - Fone: 358-1500



Secretaria Municipal de Saúde Pública

INFORME-SE E PROTEJA-SE!

S D I A



A relação sexual é a forma mais comum de contrair aids.

Aids não tem cura. Usando camisinha em todas as relações sexuais, você evita aids e todas as demais doenças sexualmente transmissíveis - sífilis, gonorréia, cancro mole, herpes genital, crista de galo, mola e outras.

ASSIM PEGA

- Sexo na vagina sem camisinha
- Sexo anal sem camisinha
- Sexo oral sem camisinha
- Uso de seringa por mais de uma pessoa
- Transfusão de sangue contaminado
- Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação
- Instrumentos que furam ou cortam não esterelizados.

O uso de drogas injetáveis é uma forma de transmissão.

Se você usa drogas injetáveis:

- Use sempre o seu próprio equipamento (seringa, agulha, água, colher, copo etc.) - todos esses equipamentos oferecem risco de contaminação;
- Não compartilhe o local onde prepara a dose e nem reutilize agulhas

Se você está grávida, peça ao seu médico para fazer o teste da aids.

O vírus da aids, o HIV, pode ser transmitido para recém-nascido em três momentos: durante a gravidez, no parto ou na amamentação.

O tratamento pode evitar que o bebê tenha aids; é feito com o remédio AZT, distribuído gratuitamente na rede pública de saúde. Quanto mais cedo a gestante soropositiva iniciar o tratamento, maiores as chances de a criança nascer sem o HIV.

Proteja seu bebê da aids

A transmissão do vírus da mãe para o filho é responsável pela maioria dos casos de aids em crianças. O tratamento da gestante HIV + aumenta em até 70% a chance de o bebê nascer sem o vírus. Por isso, a mulher precisa exigir o teste da aids quando fizer o pré-natal. Caso o resultado dê positivo, deve exigir o tratamento adequado.



Faça o teste da aids



Para detectar o HIV, é necessário fazer um teste de sangue em laboratório. Hoje ele pode ser realizado sem pedido médico nos Centros de Testagem e aconselhamento (CTA), nos laboratórios particulares e em serviços de saúde pública.

Os CTA contam com profissionais de saúde aconselhadores que acompanham a pessoa antes e depois do exame. **Tudo é feito de maneira sigilosa e gratuita.** O exame é feito por meio da coleta simples de sangue, com material descartável, e não é preciso estar em jejum.

E lembre-se: o exame só pode ser feito após **3 meses** de a pessoa ter se exposto a alguma situação de risco (sexo sem camisinha, uso de seringa de outras pessoas etc.). Ou seja, depois da janela imunológica: período em que seu corpo ainda não produziu anticorpos suficientes para serem detectados, podendo dar um resultado falso-negativo. **Importante refazer o teste após três meses.**

Não vacile! Quem se ama, se cuida. Faça o teste da aids.